ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน ในพยาบาลสตรี

ชื่อผู้เขียน

นางสาวชนิดา สุรจิตต์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

พนธ์	โพสิโทรย์	ง ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์เจียรนัย	ปริสัญญูกุล	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ คร.สุกัญญา	โปธิบาล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ลินจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.พัชราภ		กรรมการ

ๆเทดัดย่อ

โรคกระดูกพรุนเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญของสตรีวัยหมดประจำเดือน พยาบาล สตรีเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสประสบกับโรคนี้ ดังนั้นจึงได้ทำการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหา ความสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันโรค กระดูกพรุนในพยาบาลสตรี และความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการ ป้องกันโรคกระดูกพรุนในพยาบาลสตรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พยาบาลสตรี อายุระหว่าง 30-50 ปี ที่ ป้องกันโรคกระดูกพรุนในพยาบาลสตรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พยาบาลสตรี อายุระหว่าง 30-50 ปี ที่ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 230 คน คัดเลือก ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 230 คน คัดเลือก กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความเชื่อด้านสุขภาพ และแบบ สบาวมหฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพยาบาลสตรีที่ผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบสัมภาษณ์ สอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพยาบาลสตรีที่ผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบสัมภาษณ์ ข้อ ของ ธีรนันท์ สิงห์เฉลิม (2542) แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และ ข้อ ของ ธีรนันท์ สิงห์เฉลิม (2542) แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และ กวามเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และหาค่าความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการศึกษาพบว่า

- 1. ความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวม การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค และการรับรู้ ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคอยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้ความรุนแรง ของโรคอยู่ในระดับสูง ส่วนการรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคอยู่ในระดับ ต่ำ
 - 2. พฤติกรรมการป้องกันโรคอยู่ในระดับปานกลาง
- 3. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 พบว่า ความเชื่อค้าน สุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคในระดับต่ำมาก การรับรู้ อุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการป้องกัน โรคในระดับต่ำ ส่วนการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค และการ รับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้อง กันโรค

ผลการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้พยาบาลสตรีมี พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน และในการช่วยลดการรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติ พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน Thesis Title

Health Beliefs and Preventive Behaviors Regarding

Osteoporosis among Fernale Nurses

Author

Miss Chanida Surajitt

M.N.S.

Nursing Care of Women

Examining Committee

Associate Professor Jiaranai	Bhosai	Chairman
Associate Professor Dr.Sukanya	Parisunyakul	Member
Assistant Professor Dr.Linchong	Pothiban	Member
Assistant Professor Dr.Patcharaporn	Aree	Member

Abstract

Osteoporosis is an important health problem among postmenopausal women including female nurses. Therefore the descriptive correlational study was done to investigate health beliefs and preventive behaviors, and to determine the relationships between health beliefs, and preventive behaviors regarding osteoporosis among 230 female nurses aged between 30-50 years. The samples were selected using proportionate stratified sampling method from all hospitals under organization of Ministry of Public Health in Chiang Mai. The questionnaires were used for data collection which focussed on the Demographic data, the Osteoporosis Health Beliefs, and the Osteoporosis Preventive Behaviors adapted from the Health Belief Assessment and Health Behavior Assessment of Osteoarthritic Elderly Arthoscopic Surgery Questionnaires developed by Theeranan Singchalerm (1999). The content validity and the reliability of the instrument were tested. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson's product moment correlation coefficient.

The results of the study showed that:

- 1. The overall health beliefs, the perceived susceptability to disease, and the perceived benefits of preventive action were at moderate levels, the perceived seriousness of disease was at high level, whereas the perceived barriers of preventive action were at low level.
 - 2. The preventive behaviors was at moderate level.
- 3. The statistical tests at the level of significant .01 showed a very low positive relationship between the overall health beliefs and the preventive behaviors, a low negative relationship between the perceived barriers of preventive action and the preventive behaviors but no relationship between the rest and the preventive behaviors.

The findings suggested the ways to promote the preventive behaviors regarding osteoporosis and to minimize the perceived barriers to preventive actions regarding osteoporosis among female nurses.